



## Newcastle Disease Vaccine "Lasota" Strain

### MYVAC ND EMULSION

Vắc xin phòng bệnh Newcastle vô hoạt với chất bổ trợ dầu

#### ĐẶC TÍNH VÀ THÀNH PHẦN:

Mỗi liều MyVac ND Emulsion có chứa kháng nguyên là virus Newcastle chủng Lasota 10<sup>8.5</sup> EID<sub>50</sub>.  
Vắc xin đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, hiệu lực cao, kích thích đáp ứng miễn dịch nhanh, mỗi lọ vắc xin đều đạt các chỉ tiêu về an toàn, vô trùng, hiệu lực.

#### CHỈ ĐỊNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH VẮC XIN:

MyVac ND Emulsion kích thích tạo miễn dịch chủ động trên gà thịt, gà đẻ, gà giống giúp chống lại bệnh Newcastle.

Lịch vắc xin được khuyến cáo dưới đây được dùng như chương trình vắc xin cơ bản, có thể thay đổi cho phù hợp với điều kiện dịch tễ tại trại/địa phương hoặc tham khảo ý kiến của bác sỹ thú y để lập chương trình vắc xin phù hợp với điều kiện tại trại:

- Gà thịt: chủng vắc xin trong khoảng 21 – 35 ngày tuổi (trên gà khỏe mạnh).

**Lưu ý:** Ở những vùng áp lực mầm bệnh cao, có thể chủng nửa liều cho gà con lúc 5 ngày tuổi.

- Gà đẻ và gà giống: chủng lần đầu lúc 21 – 35 ngày tuổi (trên gà khỏe mạnh). Sau khi chủng vắc xin đầu phòng 3 bệnh ND-IB-EDS vào lúc 16 – 18 tuần tuổi, định kỳ sau 3-4 tháng, tái chủng vắc xin MyVac ND Emulsion giúp duy trì hiệu giá kháng thể bảo hộ trong suốt giai đoạn sản xuất và truyền kháng thể cho gà con qua lòng đỏ trứng.

Để xác định chính xác thời gian chủng vắc xin, nên kiểm tra hiệu lượng kháng thể hàng tháng.

#### CÁCH SỬ DỤNG VẮC XIN VÀ LIỀU LƯỢNG:

Vắc xin MyVac ND Emulsion được sử dụng bằng cách tiêm bắp tại vị trí cơ đùi/cơ ngực hoặc tiêm dưới da cổ

| Chai         | Dung tích (ml) | Gà < 21 ngày       |                        | Gà > 21 ngày       |                        |
|--------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
|              |                | Liều tiêm (ml/con) | Tổng (l chai dùng cho) | Liều tiêm (ml/con) | Tổng (l chai dùng cho) |
| Chai 500 ds  | 250 ml         | 0.25               | 1000 gà                | 0.5                | 500 gà                 |
| Chai 1000 ds | 500 ml         | 0.25               | 2000 gà                | 0.5                | 1000 gà                |
| Chai 2000 ds | 500 ml         | 0.1                | 5000 gà                | 0.25               | 2000 gà                |

#### CẢNH BÁO VÀ LƯU Ý ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG:

1. Không sử dụng vắc xin khi thấy vỏ chai có vết rạn, vỡ hoặc đã bị mất niêm phong
2. Lắc kỹ vắc xin trước và trong khi sử dụng.
3. Vắc xin nên được để ở nhiệt độ phòng để đưa về nhiệt độ khoảng 24 – 27°C trước khi sử dụng.
4. Chỉ chủng vắc xin cho gà khỏe mạnh.
5. Sau khi mở nắp, nên sử dụng hết lượng vắc xin trong vòng 24 giờ để tránh tạp nhiễm và đảm bảo hiệu quả của vắc xin.
6. Nên sử dụng bơm tiêm (xi lanh) tự động để chủng vắc xin, bơm tiêm (xi lanh) cần được tiệt trùng trong nước sôi khoảng 30 phút. Không sử dụng các chất sát trùng để rửa dụng cụ trước khi làm vắc xin.
7. Không pha chung với các vắc xin khác.
8. Điều tra tình hình dịch tễ tại trại/địa phương để đưa ra lịch vắc xin phù hợp hoặc tham khảo tư vấn của bác sỹ thú y.

#### LƯU Ý XỬ LÝ CHAI, LỌ, DỤNG CỤ VẮC XIN THỪA SAU KHI TIÊM:

Sau khi chủng xong vắc xin, những lọ vắc xin còn thừa phải được khử trùng trước khi thải theo quy định của địa phương.

#### TƯƠNG TÁC:

Không nên kết hợp với các vắc xin khác nếu không có tư vấn của BS.TY.

**PHẢN ỨNG PHỤ:** Không khuyến cáo.

**QUÁ LIỀU:** Không áp dụng.

#### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không sử dụng cho gà yếu hoặc đang mắc bệnh.

**THỜI GIAN NGỪNG SỬ DỤNG THUỐC:** Không.

**VẬN CHUYỂN:** Trong quá trình vận chuyển, vắc xin luôn phải bảo quản trong thùng cách nhiệt có dự trữ đá lạnh, nhiệt độ từ 2 – 8°C.

**QUY CÁCH:** 500, 1000, 2000 liều.

**BẢO QUẢN:** Trong tủ mát, tránh ánh sáng mặt trời, nhiệt độ từ 2-8° C.

Vắc xin vô hoạt, nhũ dầu

#### CHỈ DÙNG TRONG THÚ Y

Số ĐK : MVP-7

Lô SX : Xem trên bao bì mục Batch

Ngày SX: Xem trên bao bì mục Date

HSD : Xem trên bao bì mục Exp

**Nhà sản xuất:** MALAYSIAN VACCINES AND PHARMACEUTICALS SDN.BHD

Lot 11182, Batu 20, Jalan Puchong Kajang, Pulau Meranti, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia.

Tel : 603 80615701/2 ; Fax : 603 80612557

**Xuất xứ:** Malaysia

**Nhập khẩu:** Công ty CP Thú Y Xanh Việt Nam

Địa chỉ: Lô A2, CN4, CCN Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội

**Phân phối bởi:** Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Xanh Việt Nam

VP HN: Lô A2, CN4, CCN Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

VP HCM: 83 Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6, TP. HCM



150 mm(W) X 200 mm (H) FRONT

150 mm(W) X 200 mm (H) BACK